



Hoja de Información sobre el Sativex[®] (spray oral).

Información para el usuario

1. Agite el frasco (vial) suavemente.
2. Abra el tapón.
3. Cuando abra por primera vez el frasco, firmemente y rápidamente presione el spray sobre un pañuelo o pedazo de papel tres o cuatro veces para que el spray no quede bloqueado y la bomba del spray esté llena.
4. Coloque el frasco en posición vertical aproximadamente a 4 cms de la zona de la boca escogida para la administración.
5. Con cuidado que no toque los labios, aplique el medicamento dentro de la boca, debajo de la lengua o en la cara interna de la mejilla. No trague la pulverización.



6. Intente evitar tragar hasta que el medicamento sea absorbido totalmente.
7. Repita los pasos 4 a 7 hasta que se hayan administrado el número total de pulverizaciones permitidas.
8. Tape el frasco.
9. Almacene el frasco en un lugar seguro.
10. Si hace más de 1 semana que no ha usado el frasco, siga las instrucciones desde el paso 1.

Información para el almacenaje

- El medicamento sin abrir deberá ser almacenado en el frigorífico.
- El medicamento abierto deberá ser almacenado en el frigorífico cuando sea posible pero lo podrá llevar consigo durante el día si lo necesita.
- Si es posible guarde el frasco de pie, en posición vertical.
- Manténgase fuera del alcance y vista de niños y animales.
- No deje los frascos en un sitio con temperatura elevada como por ejemplo expuestos a la luz directa del sol o cerca de radiadores o estufas.
- Para evitar la pérdida o rotura del frasco, almacénelo en un lugar seguro.
- En cada visita devuelva siempre todos los frascos usados y no usados.
- Una vez abierto el frasco úselo dentro de los 14 días desde su primer uso.

Precauciones de Seguridad

- No dé este medicamento a ninguna otra persona.
- Mantenga el spray lejos de sus ojos.
- No utilizar la medicación cerca de niños o animales.
- Si el medicamento llega a entrar en contacto con sus ojos o su piel, deberá lavarse la parte afectada inmediatamente con abundante agua.
- Cualquier salpicadura en algún otro sitio deberá limpiarla inmediatamente con un pañuelo, trapo u otro material absorbente que deberá ser desechado rápidamente.
- Evite el contacto del spray con fuego u otras sustancias químicas.
- Este producto es inflamable, cierre el frasco siempre después de usarlo.

Posibles efectos secundarios del sativex®

Si noto **mareos, sensación de embriaguez, perder el contacto con la realidad, desorientación, sensación de debilidad intensa, concentración baja y olvidadiza:**

¿Qué debo hacer?

- Parar la dosis hasta que los efectos secundarios desaparezcan.
- Tranquilícese y piense que los efectos secundarios desaparecerán en unas horas.
- Descanse tranquilamente hasta que desaparezcan los efectos secundarios.
- Para evitar que los efectos secundarios aparezcan de nuevo, reduzca la dosis y dosifique siguiendo el protocolo. Si los síntomas persisten, reduzca a la dosis previamente tolerada.

Si noto **mal sabor**

¿Qué debo hacer?

- A los 5 minutos después de haber usado el spray enjuagar la boca y tragar.
- Chupar un caramelo.

Si noto **escozor**

¿Qué debo hacer?



- Una vez absorbido el medicamento/la pulverización y completado la dosis, enjuáguese la boca con agua y trague, especialmente en la dosis de última hora de la noche.
- No aplique la pulverización en zona dolorida o enrojecida.
- Aplique la pulverización alternando las zonas mucosas de aplicación (debajo de la lengua, cara interna de la mejilla.).