

4.3 Vacuna antidiftèrica, antitetànica, antipertússica acel-lular, antipoliomielítica i anti-*Haemophilus influenzae* tipus b (DTPa-pòlio-Hib)

Definició

Vacuna inactivada pentavalent que combina la DTPa amb poliovirus inactivats tipus 1, 2 i 3 i el polisacàrid capsular purificat de l'Hib, conjugat amb el toxoide tetànic com a proteïna transportadora.

Composició i tipus

La composició per dosi i tipus de les vacunes actualment disponibles és la següent:

Infanrix VPI+Hib® (GlaxoSmithKline) 0,5 ml

Composició antigènica	Adjuvant	Altres components
Toxoide diftèric: 25 Lf (>30 UI)	Hidròxid d'alumini	2-fenoxietanol: 2,5 mcg
Toxoide tetànic 10 Lf (>40 UI)		Formaldehid
Toxina pertússica: 25 mcg		Lactosa
Hemaglutinina filamentosa: 25 mcg		Polisorbat: 80
Pertactina: 8 mcg		Glicina
PRP d'Hib (10 mcg) conjugat amb toxoide tetànic (30 mcg)		Medi: 199
Poliovirus 1,2 i 3: 40, 8, 32 UD-a		Polimixina

Pentavac (Sanofi Pasteur MSD) 0,5 ml

Composició antigènica	Adjuvant	Altres components
Toxoide diftèric: >30 UI	Hidròxid d'alumini	2-fenoxietanol: 2,5 mcg
Toxoide tetànic: >40 UI		Trometanol: 0,6 mg
Toxina pertússica: 25 mcg		Formaldehid: 12,5 mcg
Hemaglutinina filamentosa: 25 mcg		Tiomersal (traces)
PRP d'Hib (10 mcg) conjugat amb toxoide tetànic (30 mcg)		Gluteraldehid (traces)
Poliovirus 1,2 i 3: 40, 8, 32 UD-a		Neomicina (traces)
	Estreptomina (traces)	Polimixina B (traces)
	Sacarosa	
	Medi: 199	

Indicacions

Pautes i vies d'administració

Contraindicacions i precaucions

Reaccions adverses

(Vegeu la pàgina 39.)